

BURLO

Dipartimenti i Kirurgjië
SCO Anestezia e Rianimacioni

DEKLARATA E INFORMACIONIT DHE APROVIMI I AKTIT SHENDETESOR SPECIFIK

AKTI SHENDETESOR: TEKNIKAT E ANESTEZISE

ANESTEZIA E PERGJITHESHME/ANESTEZIA RAJONALE/QETESUESI

TRIESTE,

PJESA A

Un/ne i nenshkruari/a/i

Ne cilesine e te asistuarit te nenes te babait te prinderit te kujdestarit tjetër(specifikoje)

Eshte pergjegjese/i te plotesimit te te dhenave te poshteshenuara :

TE DHENAT E IDENTIFIKIMIT

Te dhenat e identifikimit te te asistuarit

Dati identifikativ dell'assistito

Etiketa

Mbiemri Emri.....

I lindur ne.....me.....

Banues neCAP.....

ne Rrugen.....

Te dhenat e prinderve,te bartesit te pergjegjesise prinderore*:

**Dati dei genitori del
titolare della potestà
genitoriale*:**

Emer dhe Mbiemer te prinderve

Nena Mbiemer Emer.....

E lindur neme.....

Banuese neCAP.....

Ne Rrugen.....

Babai Mbiemer Emer.....

I lindur ne.....me.....

Banues neCAP.....

Ne Rrugen.....

Bartesi i pergjegjesise prinderore

Mbiemer Emer.....

Lindur neme.....

Banues neCAP.....

Ne Rrugen.....

**Ne rastin e te miturit eshte e nevojshme aprovimi nga te dy prinderit,ose nga kush qe juridikeisht ka te drejten ta beje.Kjo nuk modifikohet edhe nqs i mituri i eshte besuar vetem njerit prej prinderve ,te cilet rezultojne te ndare ose te divorcuar,te deklaruar nga te dy.Mendimi i te miturit per aq sa lejon mosha e tij dhe pjekuria e tij merret ne konsiderate.*

**Ne rastin e prezences vetem te nje prinderi,ky i fundit nen pergjegjesine e tij duhet te deklaroje miratimin e prinditi qe mungon nepermjet modelit te vete-certifikimit (Mod 0199)*

**Ne rast prezence te perfaqesuesit ligjor bashkangjitet i gjithë dokumentacioni tregues per fuqite qe prezanton.*

DEKLAROJ/DEKLAROJME DICHIARO/DICHIARIAMO

Qe jam/jemi informuar ne menyre te qarte dhe complete nga

dott.(ne rast se duhet) me ndihmen e ndermjetesit kulturor Sig.

di essere stato/a/i in formato/a/i in maniera chiara, completa e comprensibile


Instituti i Shtrimit dhe Kurimit
te Karakterit Shkencor Pediatrik

Burlo Garofolo

Spital me specializim te larte kombetar
per shendetin e gruas dhe femijes

• 34137 Trieste • via dell'Istria 65/1 • tel.+39.040.3785.537 • fax +39.040.3785.455 • cf. 00124430323 •

DEKLARATA E INFORMACIONIT DHE APROVIMI I AKTIT SHENDETESOR SPECIFIK DHE KONSENSUSI PER ANESTEZINE E PERGJITHESHME
/ANESTEZIA RAJONALE/QETESUESI



BURLO

DEKLARATA E INFORMACIONIT DHE APROVIMI I AKTIT SHENDETESOR SPECIFIK

AKTI SHENDETESOR: TEKNIKAT E ANESTEZISE

ANESTEZIA E PERGJITHESHME/ANESTEZIA RAJONALE/QETESUESI

TRIESTE,

Dipartimenti i Kirurgjië

SCO Anestezia e Rianimacioni

dal dott. _____ (se del caso) con il supporto del mediatore culturale

Sig. _____

**Instituti i Shtrimit dhe Kurimit
te Karakterit Shkencor Pediatrik**

Burlo Garofolo

Spital me specializim te larte kombetar
per shendetin e gruas dhe femijes

● 34137 Trieste ● via dell'Istria 65/1 ● tel.+39.040.3785.537 ● fax +39.040.3785.455 ● cf. 00124430323 ●

**DEKLARATA E INFORMACIONIT DHE APROVIMI I AKTIT SHENDETESOR SPECIFIKE DHE KONSENSUSI PER ANESTEZINE E PERGJITHESHME
/ANESTEZIA RAJONALE/QETESUESI**

Ne vijim te AKTIT SHENDETESOR : Ne lidhje me temat e meposhtme

DIAGNOSAT/ KUSHTET KLINIKE DIAGNOSI / CONDIZIONI CLINICHE**AKTI SHENDETESOR ATTO SANITARIO****TEKNIKAT E ANESTEZISE TECNICHE ANESTESIOLOGICHE****1. ANESTEZIA E PERGJITHESHME ANESTESIA GENERALE****2. ANESTEZIA LOKO RAJONALE ANESTESIA LOCO REGIONALE****1.1 ANESTEZIA KURRIZORE ANESTESIA SPINALE****2.2 ANESTEZIA EPIDURALE ANESTESIA EPIDURALE****3.3 BLOKIM PERIFERIK MPIRJE E GJYMTYREVE BLOCCO PERIFERICO****4.4 ANESTEZIA E KOMBINUAR (E PERGJITHESHME OSE QETESUESE PLUS RAJONALE) ANESTESIA COMBINATA****3. QETESUESE SEDAZIONE****1. ANESTEZIA E PERGJITHESHME ANESTESIA GENERALE**

Anestezia e pergjithshme eliminon krejtësisht ndjeshmerine dhimbjen. Teknika konsiston në administrimin e një gaz anestezie dhe / ose agentëve intravenoze anestezisë në kombinim me medikamente të ndryshme duke përfshirë analgesike narkotike, drogë psikotrope, paralizues muskujsh.

Dhe për më tepër kjo është kryer kryesisht në frymëmarrje përmes një tub endotracheal ose maskë laryngeal që lejon frymëmarrje manuale ose mekanike gjatë operacionit.

REZULTATE TE PARASHIKUESHME TE TRAJTIMIT- ESITI PREVEDIBILI (BENEFICI) DEL TRATTAMENTO PROPOSTO

Nevoja anatomike ose kirurgjikale e kontrollit të rrugëve të frymëmarrjes në ndërhyrjet që kërkojnë siguri të tilla e bën këtë teknikë më të përshtatshme për të ofruar këto garanzi.

RREZIQET DHE NDERLIKIMET E MUNDSHME TE TRAJTIMIT - RISCHI E COMPLICANZE EVENTUALI DEL TRATTAMENTO PROPOSTO

Të përzier dhe të vjella, aritmi të zemrës, ul presionin e gjakut, edemë pulmonare, lezionet e dhëmbëve, bronchospasm, trauma të rrugëve të frymëmarrjes, rritja dhe ulja e sheqerit në gjak, crregullime elektrolitike, dëmtime të trurit nga mungesa e oksigjenit apo Hypotension (ulje të tensionit shtypjes në gjak). Efekti i komplikimeve më të rënda varon nga 1,5 dhe 5 për çdo 100.000 anestezia dhe mund të rritet nga sëmundjet shoqëruese dhe lloji i operacionit ndërhyrjes. Anestezia e përgjithshme dhe qetësueset mund të çojnë në perceptimin e tingujve, zërave apo të nxisë shfaqjen e ëndrrave. Ky fenomen ka një frekuencë prej 0,2-0,4%

ALTERNATIVAT E MUNDSHME (ME PERFITIMET DHE RREZIQET) - LE EVENTUALI ALTERNATIVE (CON VANTAGGI E RISCHI

● 34137 Trieste ● via dell'Istria 65/1 ● tel.+39.040.3785.537 ● fax +39.040.3785.455 ● cf. 00124430323 ●

DEKLARATA E INFORMACIONIT DHE APROVIMI I AKTIT SHENDETESOR SPECIFIKE DHE KONSENSUSI PËR ANESTEZIËN E PERGJITHSHME /ANESTEZIA RAJONALE/QETESUESI

2. ANESTEZIA LOKO RAJONALE ANESTESIA LOCO REGIONALE

Heq ndjeshmëri për dhimbje në pjesë të caktuara të trupit, por nuk heq vetedijen. Në këtë teknikë janë përdorur anestetike lokale apo ilace të tjera për të arritur anestezinë ose analgjezi vetëm për pjesën që duhet provuar. Ndonjëherë para procedurës përdoret anestezia e përgjithshme me thithje ose venoze, zakonisht pa intubacione në pacientët që nuk bashkëpunojnë. Substancat për anestezinë rajonale ose qetesueset (p.sh. Opioid) mund të administrohen në doza të vetme (kurrizore ose prane bishtit), ose të përsëritet vazhdimisht nëpërmjet një kateteri të hollë (epidural). Në rast të efektit të pamjaftueshëm të kohezgjatjes së anestezisë ose të një përhapje të tepert është e nevojshme për të kaluar në një anestezia të përgjithshme.

REZULTATE TE PARASHIKUARA (PERFITIMET) TE TRAJTIMIT TE OFRUAR - ESITI PREVEDIBILI (BENEFICI) DEL TRATTAMENTO PROPOSTO

Vendndodhja e anestezisë, me pak potencialisht toksike për pacientet, incidenca e ulët e efekteve anesore.

RREZIQET DHE KOMPLIKIMET E MUNDSHME TE TRAJTIMIT - RISCHI E COMPLICANZE EVENTUALI DEL TRATTAMENTO PROPOSTO

Anestezia kurrizore është e lidhur me presionin e ulët të gjakut (33%), me uljen e frekuencave të zemrës (13%), të përzier (18%) dhe dhimbje koke (3,9%). Komplikime me të rënda janë shumë të rralla. Anestezia epidurale mund të shkaktojë fushat e shpimi gjilpërash në këmbë ose çrregullime lëvizshmërie të cilit incidenca i shkon 1,6-2 për 10.000 anestezia.

Ky efekt është zvogëluar më tej në vitet e fundit

Komplikime me të rënda, hematoma peridurale, mund të ndodhë në një rast mbi 100-150000 anestezia epidurale.

ALTERNATIVAT E MUNDSHME (ME PERFITIMET DHE RREZIQET) - LE EVENTUALI ALTERNATIVE (CON VANTAGGI E RISCHI)**2.1 ANESTEZIA SPINALE (KURRIZORE) ANESTESIA SPINALE**

Injeksioni bëhet në hapësirën subaracnoideo që është në lengun cerebrospinal të shtyllës kurrizore, shpesh paraprihet nga një anestezia lokale dhe ben efekt mbas disa minutash.

2.2 ANESTEZIA EPIDURALE ANESTESIA EPIDURALE

Injeksioni praktikohet në hapësirën epidurale (midis pjesës së fortë dhe murit të kanalit kurrizor) ku vendoset një kateter i hollë me nivelin:

-e kolones kurrizore të mesit (anestezia epidurale e mesit)

-e kolones kurrizore të krahavorit (anestezia epidurale e krahavorit)

-e kokës (anestezia epidurale që është prane bishtit). Në këtë rast administrohet një dozë e vetme ilaci, shumë rrallë vendoset një kateter i vogël.

Efekti është jo më heret se 15 minuta.

Normalisht injeksioni nuk është i dhimbshëm sepse paraprihet nga një anestezia lokale.

Avantazhi i kësaj teknike është që të lejon nëpërmjet kateterit një kontroll të shkëlqyer të dhimbjeve mbas operacionit.

● 34137 Trieste ● via dell'Istria 65/1 ● tel.+39.040.3785.537 ● fax +39.040.3785.455 ● cf. 00124430323 ●

DEKLARATA E INFORMACIONIT DHE APROVIMI I AKTIT SHENDETESOR SPECIFIKË DHE KONSENSUSI PËR ANESTEZINË E PËRGJITHSHME /ANESTEZIA RAJONALE/QETESUESI

Mund te kombinohen te dy teknikat (spinale dhe epidurale) me avantazhin qe efekti i anestezise ndodh perpara dhe zgjat me shume.

2.3 BLOKIM PERIFERIK BLOCCO PERIFERICO

Qendron ne anestezine e nje nervi periferik ose te nje kompleksi nervash (psh. Blokim te penisit,te dores,te kembes etj).

REZULTATE TE PARASHIKUARA (PERFITIMET) TE TRAJTIMIT TE OFRUAR - ESITI PREVEDIBILI (BENEFICI) DEL TRATTAMENTO PROPOSTO

Copezim maksimal keshtu qe toksiteti me i ulet i anestezise.

RREZIQET DHE KOMPLIKIMET E MUNDSHME TE TRAJTIMIT – RISCHI E COMPLICANZE EVENTUALI EL TRATTAMENTO

Eshte i mundur injektimi i anestezise ne nje ene te gjakut me shperndarjen e te njejtut dhe te shperthimit te nje krize ose te reaksioneve te renda te kardio-qarkullimit te gjakut (raste shume te rralla),ematoma,demtime te nervit periferik,shpesh kalimtare,te ndjeshmerise se pjeses se interesuar ne 1,9 raste mbi 10.000.

ALTERNATIVAT E MUNDSHME (ME PERFITIMET DHE RREZIQET) – LE EVENTUALI ALTERNATIVE (CON VANTAGGI E RISCHI)**ANESTEZIA E KOMBINUAR (E PERGJITHSHME OSE QETESUESE PLUS LOKO-RAJONALE) ANESTESIA COMBINATA**

Kombinimi i anestezise se pergjithshme me anestezine rajonale zvogelon nevojen per anestezi te pergjithshme,shkurton fazen e zgjimit dhe siguron heqjen e ndjeshmerise se dhimbjeve mbas nderhyrjes kirurgjike.

Aplikohet kur nuk eshte e mundur te ndjekesh vetem nje teknike te anestezise loko-rajonale(psh.femijet),per nevojshmerine per te intubuar pacientin ose kur eshte nevoja per te siguruar nje kontroll te mire te dhimbjes mbas operacionit.

3. QETESUESET SEDAZIONE

Eshte nje teknike qe perfshin perdorimin e ilaceve qetesuese ose hipnotizuese qe te shkaktojne heqjen e pjesshme te vetedijes.

Shpesh jepen ilace per te reduktuar ose eliminuar dhimbjet.

Ndonjehere qetesuesit i bashkangjitet nje anestezi lokale .

ASNJE PROCEDURE E ANESTEZISE NUK MUND TE JETE PA ASNJE RREZIK,EDHE PSE E PRAKTIKUAR NGA PROFESIONISTE EKSPERTE DHE TE KUJDESSHEM.**ME SHUME INFORMAZIONE TE KARAKTERIT TE ANESTEZISE ULTERIORI INFORMAZIONI DI CARATTERE ANESTESIOLOGICO****ANESTEZI MBAS OPERACIONIT ANALGESIA POSTOPERATORIA**

Gjithmone sigurohet nje anestezi e pershtatshme ne 24-48 oret e para mbas nderhyrjes nepermjet futjes se ilacit venoz ose epidurale.

PROBLEME TE TJERA ALTRI PROBLEMI

Ne periudhen para operacionit mund te jene perdorur ilace qe akoma nuk jane te regjistruar ne Itali per perdorim jepen ne menyra te ndryshme (me goje,nepermjet venave etj) ne te cilen perdorimi eshte vertetuar nga provat shkencore dhe qe perdoren normalisht ne shume spitale pediatrike

PROCEDURAT SHOQERUESE DHE PASUESE PROCEDURE CONCOMITANTI E SUCCESSIVE

Para,ne mes dhe mbas nderhyrjes,mund te jene te nevojshme procedurat invazive jo pa rreziqe duke perfshire :

● 34137 Trieste ● via dell'Istria 65/1 ● tel.+39.040.3785.537 ● fax +39.040.3785.455 ● cf. 00124430323 ●

DEKLARATA E INFORMACIONIT DHE APROVIMI I AKTIT SHENDETESOR SPECIFIKE DHE KONSENSUSI PER ANESTEZINE E PERGJITHSHME /ANESTEZIA RAJONALE/QETESUESI

1. Futja e kateterave venoze periferik ose qendror (CVC)

Futja e kateterave venoze ne qendrat periferike ose qendrore ben te mundur futjen e ilaceve te perdorura per anestezi ne por edhe te perberesve glukozhe dhe te substancave terapeutike.

VAZHDON ... INFORMAZIONE TE TJERA TE KARAKTERIT TE ANESTEZISE

Efektet e komplikazioneve te lidhura me gjetjen e tubave te venave qendrore ne te cilat ematoma,futja e ajrit ne vena,trauma te mushkerive,infeksione,lekundet rreth 2 deri 15%.

2. Infuzione te produkteve te gjakut

Vetëm nëse gjendja klinike do të kërkojë përdorimin e transfuzionit të gjakut ose derivateve të gjakut duke respektuar rregullat e përdorimit të tij të mirë pa plotësimin e konsensusit informues.

3. Futja e kateterit arterial

Per te lehtesuar zbulimin e presionit arterial dhe per zbatimin e analizave te gjakut

4. Futja e kataterit epidurale

Per te menaxhuar anestezine mbas operazonit

PA NGRENE PARA OPERAZIONIT DIGIUNO PREOPERATORIO

Para nderhyrjes do te jete e nevojshme te jeni pa ngrene si eshte e treguar ne(mod 0221)

MBAS OPERAZIONIT POST OPERATORIO

Ne fund te nderhyrjes kirurgjike pacienti do te mbahet ne veshgim per nje periudhe te pershtatshme ne sallën e rizgjimit.Kur kushtet klinike do te jene normalizuar,mund te kthehet ne repartin e shtrimit.Nqs do te jete e nevojshme nje zgjatje e monitorimit klinik do te trasferohet ne repartin e Terapise Intensive sipas udhezimeve te mjekut anesteziat.

SHENIME NOTE

NENSHKRIMI I KONSENSUSIT - ACQUISIZIONE DEL CONSENSO**DEKLAROJ/DEKLAROJME DICHIARO/DICHIARIAMO**

Qe jemi ne dijeni per mundesine e anulimit te konsensusit ne cdo moment perpara Aktit/trajtimet shendetesor te ofruar dhe te:

☐ **PRANOJ-ACCETTARE**☐ **NUK PRANOJ-NON ACCETTARE**

Lirisht, vullnetarisht dhe me ndërgjegje të plotë / tim tonë pëlqimin për aktin shendetesor

Liberamente, spontaneamente ed in piena coscienza il mio/nostro consenso all'atto sanitario:

- ☐ **ANESTEZIA E PERGJITHSHME-ANESTESIA GENERALE** (sheno kutine perkatese)
- ☐ **ANESTEZIA LOKO –RAJONALE-ANESTESIA LOCO REGIONALE**

☐ ANESTESIA KURRIZORE-ANESTESIA SPINALE

☐ ANESTESIA EPIDURALE-ANESTESIA EPIDURALE

☐ BLOKO PERIFERIKO-BLOCCO PERIFERICO

☐ ANESTEZIA E KOMBINUAR (E PERGJITHSHME OSE QETESUES PLUS LOKO-RAJONALE)-ANESTESIA COMBINATA (GENERALE O SEDAZIONE PIÙ LOCO-REGIONALE)
- ☐ **QETESUESE-SEDAZIONE**

Mbi kete In merito a :

(sheno kutine perkatese)

- ☐ **NDERHYRJA KIRURGJIKE-INTERVENTO CHIRURGICO (specifikoje)**
PJESA ANESORE LATERALITA' ☐ NP ☐ MAJTAS SINISTRA ☐ DJATHTAS DESTRA VENDI SEDE
- ☐ **ANALIZAT DIAGNOSTIKUESE-ESAME DIAGNOSTICO**

Te propozuar per Proposto per:

- ☐ **VETEN TIME ME STESSO** (sheno kutine perkatese)
- ☐ **DJALIN OSE VAJZEN TIME TE MITUR MIO FIGLIO/A MINORE**
- ☐

JAM INFORMUAR PER TEKNIKEN E ANESTEZISE E SIPERPERMENDUR MUND TE PESOJE MODIFIKIME VETEM NQS DO TE JENE TE NEVOJSHME GJATE NDERHYRJES NE BAZE TE VARIANTEVE TE MUNDSHME PATOLOGJIKE DHE KIRURGJIKE TE PAPARASHIKUARA.

Deklaroj qe jam informuar qe kushtet shendetesore Dichiario di essere stato informato che le condizioni di salute di:

- ☐ **VETES SIME ME STESSO** (sheno kutine perkatese)
- ☐ **DJALIN OSE VAJZEN TIME TE MITUR MIO FIGLIO/A MINORE**
- ☐

Vendosin te interesuarin ne collocano l'interessato nella:

KLASIN ASA-CLASSE ASA

Dhe qe rreziku relativ per nderhyrjen kirurgjike eshte e che il rischio relativo all'intervento chirurgico è:

- ☐ **NORMALE-NORMALE** (sheno kutine perkatese)
- ☐ **RRITES-AUMENTATO**

Data

Firma e lexueshme e te asistuarit/i keshilltarit juridik /i perfaqesuesit
Firma leggibile dell'assistito/a e/o del/i legale/i rappresentante/i

● 34137 Trieste ● via dell'Istria 65/1 ● tel.+39.040.3785.537 ● fax +39.040.3785.455 ● cf. 00124430323 ●

DEKLARATA E INFORMACIONIT DHE APROVIMI I AKTIT SHENDETESOR SPECIFIKE DHE KONSENSUSI PER ANESTEZINE E PERGJITHSHME /ANESTEZIA RAJONALE/QETESUESI

Te tjera (specifikojë)	Mjeku (Vula dhe firma e lexueshme) Il Medico (timbro e firma leggibile)
------------------------	---

E DREJTA PER TA ANULLUAR – DIRITTO DI REVOCA

DEKLAROJ/DEKLAROJME QE DUAM TE ANULLOJME KONSENSUSIN

DICHIARO/DICHIARIAMO DI VOLER REVOCARE IL CONSENSO

Une/ne i/te
nenshkruari/et.....

Ne cilesine e in qualità di

te asistuarit assistito te nenes madre te babait padre te prinderve genitori te kujdestarit tutore
tjeter (specifikojë) altro (specificare)

Data

Firma e lexueshme e te asistuarit/i keshilltarit juridik/i perfaqesuesit
Firma leggibile dell'assistito/a e/o del/i legale/i rappresentante/i