



Donne anziane, disabili, donne con storie psichiatriche

Laura Pomicino



Qualche dato...

- Il 36% delle donne che è in “cattive condizioni di salute” e il 36.6% di chi ha “limitazioni gravi” ha subito violenze fisiche o sessuali nel corso della propria vita
- Il rischio di subire stupri o tentati stupri è doppio (10% vs 4.7% delle donne che non presentano questo tipo di problemi)

[Istat, 2015]



Violenza psicologica?

PROSPETTO 15. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO ALMENO UNA FORMA DI VIOLENZA PSICOLOGICA PER ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE DONNE. Anno 2014 (per 100 donne con il partner attuale o ex partner)

CARATTERISTICHE DELLA DONNA	Partner attuale	Ex partner
SALUTE AUTOPERCEPITA		
Bene o molto bene	24.8	45.6
Nè bene nè male	32.5	46.3
Male o molto male	35.3	54.2
MALATTIE CRONICHE O PROBLEMI DI SALUTE DI LUNGA DURATA		
Sì	30.9	47.9
No	25.3	45.6
LIMITAZIONI, CHE DURANO DA ALMENO 6 MESI, NELLE ATTIVITÀ		
Limitazioni gravi	31.4	51.8
Limitazioni non gravi	33.6	52.2
Nessuna limitazione	25.0	44.8



E in Europa?

Table A3.2: Prevalence of various forms of violence by women's assessment of their health and disability (%)

	No disability, health problem, or limitation in everyday activities	Some form of disability, health problem, or limitation in everyday activities
Any physical or sexual violence by any partner (current or previous) since the age of 15 ^a	19	34
Psychological violence by any partner (current or previous) since the age of 15 ^a	41	54
Any physical or sexual violence by non-partner since the age of 15 ^b	20	31
Any sexual harassment since the age of 15 ^b	54	61
Any stalking since the age of 15 ^b	17	26
Any physical, sexual or psychological violence before the age of 15 ^b	33	46

Notes: *a* Women who have a current or previous partner, and no disability, limitation in everyday activities or health problem *n* = 32,864; women who have a current or previous partner, and some form of disability, limitation in everyday activities or health problem *n* = 2,247.

b Women who do not have a disability, functional limitation or health problem *n* = 34,509; women who have some form of disability, limitation in everyday activities or health problem *n* = 7,493.

Source: FRA gender-based violence against women survey dataset, 2012



E ancora....

- ◆ Stati Uniti, uno studio in un servizio psichiatrico indica che il 57% delle donne e il 17% degli uomini aveva subito una violenza sessuale (Cusack et al. 2004).
- ◆ Il 50% delle giovani tossicodipendenti e a condotta socialmente deviante è stata vittima di abuso sessuale non trattata e fra quelle che hanno rischiato di morire per overdose, il 72% riferisce di aver subito una qualche forma di violenza sessuale (Bianchi & Moretti, 2006)
- ◆ Su 82 donne affette da HIV/AIDS che riportavano ideazioni suicidarie (50% del totale delle utenti del Servizio specialistico), 78 (95%) ha subito violenza di genere (Ceccon et al., 2014)



Noi e loro

Ricerca in FVG, Operatori servizi psichiatrici e delle dipendenze (Minin, 2012):

Solo il 3% degli intervistati pone sempre/quasi sempre alle/ai pazienti una domanda su eventuali violenze o abusi subiti, il 24% mai/quasi mai

Ricerca in FVG c/o Centri antiviolenza (Feresin, 2015) :

Le donne vittime di IPV presentavano sintomi depressivi nel 44% dei casi, sintomi da disturbo post-traumatico nel 92% dei casi e sintomi psicotici, quali sentire voci, nel 16% dei casi. Inoltre avevano un basso senso di autoefficacia il 57,3% delle donne e il 22,7% riportava limitazioni nelle attività quotidiane



Ipotesi esplicative

Dipendenza *percepita e reale*, anche come ostacolo alla richiesta di aiuto

Condizione di **minore credibilità** e quindi **ridotto accesso** a potenziali supporti

"Asexual beings", *"not proper sexual beings"*, che non possono raggiungere la maturità adulta e incarnare i ruoli tradizionali di compagne/mogli e madri

Limiti più ampi fra ciò che è lecito e ciò che non lo è

Ulteriori "spazi" per esercitare violenza

Ridotte esperienze di consapevolezza e minore accesso alle informazioni

Maggiore rischio di vittimizzazione secondaria: *"la violenza deriva dalla condizione di chi la subisce"*

[Shah et al., 2016]



Donne anziane

Problematiche aggiuntive: partner ma più spesso anche figli

Presenza di deficit cognitivi: difficoltà di essere credute e avere accesso alle risorse

Condizione di dipendenza

Effetti della violenza protratta

[McGarry et al., 2017]



Dalla teoria alla pratica

Donna 38enne, tossicodipendente, in carico ai Servizi sociosanitari da lungo tempo: accesso in PS con evidenti segni di percosse e sotto gli effetti di sostanze

Donna 85enne, con un moderato deterioramento cognitivo, convivente con il figlio 50enne: accesso in PS per una crisi respiratoria successiva a una riferita aggressione del figlio

Donna 42enne, già seguita dal Centro di Salute Mentale di competenza per problematiche maniaco-depressive: accesso in PS per riferita aggressione da parte dell'attuale convivente



Grazie

laura.pomicino@yahoo.it